



کدشناسه: F-TEP-169

آمادگی‌های مورد نیاز بیماران جهت انجام PET-CT

تاریخ تدوین: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

Scan بیماران دیابتی

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

واحد بهبود کیفیت

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین

بیماران دیابتی باید تمام موارد ذکر شده بالا مانند رژیم غذایی کم کربوهیدرات، قطع مصرف متفورمین و ترکیبات حاوی آن، ناشتایی و مصرف آب به میزان کافی قبل از آزمون و غیره را رعایت نمایند. همچنین با توجه به نوع انسولین دریافتی فرآیندهای زیر را نیز رعایت نمایند:

❖ انسولین های با اثر سریع

در بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین با اثر سریع نوبت دهی از ساعت ۱۲ ظهر به بعد صورت می گیرد. لذا پس از هماهنگی با پذیرش در مورد زمان دقیق آزمون، با در نظر گرفتن رعایت ناشتایی ۶ ساعت تا زمان آزمون، به ترتیب انسولین خود را تزریق نمائید، صبحانه خود را میل نمائید و سپس ناشتایی ۶ ساعت خود را رعایت کنید.

انسولین های با اثر سریع	
لیسپرو (هومولوگ) ساخت شرکت لیلی	گلولیزین یا اپیدرا
آسپارت (نوولوگ) ساخت شرکت نووونوردیسک (Novo)	کوتاه اثر / رگولار (Regular)

❖ انسولین های با اثر متوسط

در بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین با اثر متوسط، انسولین را شب قبل از آزمون تزریق نمائید. سپس از ساعت ۱۲ شب به بعد شرایط ناشتایی را رعایت نمائید.

انسولین های با اثر متوسط	
انسولین NPH و یا طولانی اثر	انسولین گلارژین یا لنتوس Lantus / Glaine
انسولین دتمیر یا لومیر Levemir / Detemir	انسولین توجئو Toujeo

❖ داروهای سولفونیل اوره یا ترکیبات حاوی آن

در بیماران مصرف کننده داروهای زیر، لازم است از مصرف دارو در صبح آزمون خودداری گردد.

Gliclazide (گلی کلازید)	Tolbutamide (تولبوتامید)	DIAMICRON MR(Gliclazide) دیامیکرون ام آر (گلی کلازید)	Glimepiride آماریل (گلی مپراید)
Minidiab / Glibenese (Glipizide) مینی دیاب / گلی بنس (گلی پیزاید)		DIAMICRON (Gliclazide) دیامیکرون (گلی کلازید)	DAONIL دائونیل (گلی بنکلامید)